



INSTRUKS FOR BUCCOLAM

Udarbejdet af	Navn, titel: Sygeplejerske Mette Line Pedersen og Kvalitets- og udviklingskonsulent Risikomanager Christine Vammen Dato: : 3/10-2019
Revideret af	Navn, titel: Sygeplejerske Annette Frederiksen Dato: 2021-11-22
Godkendt af	Navn, titel: Kvalitets- og udviklingskonsulent Risikomanager Christine Vammen Dato: 2021-11-22
Version	Nr.: 1.1
Formål	At instruere personalet til at administrere Buccolam korrekt, så borgeren får brudt sit epileptiske anfald og opnår det bedst mulige resultat af behandlingen.
Instruksens virkningsområde	Pædagoger, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, ikke sundhedsfagligt personale og vikarer, der arbejder på Siriusparken.
Ansvarsfordeling	Medarbejderne har ansvar for at instruksen læses og efterleves. Lederen har ansvar for at instruksen er udarbejdet, tilgængelig og implementeret. Ledelsens ansvar er desuden, at der er ansat personalet, som er kvalificeret til og instrueret i at udføre den delegerede/opgaveoverdraget opgave. Sygeplejersken på bostedets ansvar at personalet er oplært til at varetage opgaven efter instruks for opgave overdragelse. Medarbejderens ansvar at tilegne sig kompetencen til at udfører opgaven



INDHOLD

Metode	3
Fremgangsmåde	3
Når borgeren har et epileptisk anfald, skal følgende gøres:	3
Ring straks 112 hvis:	4
Dokumentation	5
Kvalitetskontrol	6
Baggrundsviden	6
Kilder	6
Bilag 1	6



Metode

Denne instruks tager ikke udgangspunkt i en type anfald eller en bestemt dosis Buccolam, så læs derfor altid borgerens medicinskema og følg lægens ordination.

Fremgangsmåde

Når borgeren har et epileptisk anfald, skal følgende gøres:

- Hvis det er muligt, så notér tidspunktet hvor anfaldet starter og slutter.
- Find borgerens medicinskema og læs ordinationen på Buccolam.
- Tag handsker på.
- Tag plasttuben med Buccolam, bryd den børnesikrede forsegling, og tag sprøjten med Buccolam.



Foto: Shire.com

- Tag den røde hætte af sprøjten med Buccolam. Vær opmærksom på, at sprøjten er helt fri for den røde hætte samt 'tip-hætten', som sidder i den røde hætte.






Foto: Shire.com



- Tag et blødt materiale fx en trøje, pude eller dyne og læg under borgerens hoved, så begge hænder er fri til at give Buccolam. Hvis borgeren sidder op, kan det være lettere at støtte borgerens hoved mod din skulder, så begge hænder er fri til at give Buccolam.
- Borgerens ene kind trækkes forsigtigt tilbage, lige nok til at placere enden på sprøjten i siden af munden, mellem gummen og kinden (kindhulen). Sprøjten skråtstilles for at sikre, at enden af sprøjten er et godt stykke inde i kindhulen.



Foto: Shire.com

- Stemplet på sprøjten trykkes langsomt ned for at frigive hele mængden af Buccolam i siden af munden. Forsøg ikke at frigive væsken i munden eller at frigive det for hurtigt, da det kan resultere i spild. Det kan være lettere, at frigive halvdelen af Buccolam i den ene side af munden, og den anden halvdel i den anden side af munden.

Ring straks 112 hvis:

- anfaldet varer mere end 5 minutter og den ordinerede dosis Buccolam er givet til borgeren.
- anfaldet gentager sig.



- anfaldet er anderledes eller længere end tidligere set
- Buccolam ikke kan gives fx pga. opkast eller savl.
- borgerens vejrtrækning bliver langsom eller stopper.
- borgeren er kommet til skade under anfaldet.
- anfaldet er fulgt af høj temperatur
- borgeren efter brudt anfald virker konfus eller anderledes i adfærden end normalt.

Dokumentation

Autoriseret personale	<p>Alle autoriserede sundhedspersoner, fx sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, skal dokumentere udførelsen af deres arbejde, jf. journal-føringsbekendtgørelsen.</p> <p>Ikke autoriseret personale</p> <p>Dokumentationsforpligtelsen følger altid med udførelsen af en sundhedslovsopgave.</p>
Retningslinjer for dokumentation	<p>Dokumentér at borgeren har haft et anfald.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notér tidspunktet for anfaldet • Hvor lang tid anfaldet varede • Noter hvor meget Buccolam, der er givet • Hvordan har effekten været. <p>Husk at dokumentere hvad dine kollegaer skal være særligt opmærksomme på, fx hvis der observeres ændringer i adfærd og vejrtrækning.</p> <p>Dokumentér også i borgerens anfalds skema, da dette bidrager til at sikre, at borgeren får sikker behandling og opfølgning.</p> <p>Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten og senest inden vagtens ophør.</p>
For social og Psykiatri	<p>gælder, at der dokumenteres i Cura</p>
For Omsorg og Sundhed	<p>gælder, at der dokumenteres i Cura efter gældende arbejdsgange.</p>
Ansvar	<p>Det sygeplejefaglige personale er ansvarlige for at journalføre deres selvstændige opgavevaretagelse. Desuden skal det sygeplejefaglige</p>



	<p>personale journalføre delegeret og opgaveoverdraget pleje og behandling, der udføres som medhjælp.</p> <p>Det er lederens ansvar, at der er vikarlogin tilgængeligt.</p>
--	---

Kvalitetskontrol

Beskriv kvalitetskontrol

Baggrundsviden

Ved epileptiske anfald, er det vigtigt, at borgerens krop får lov til at bevæge sig frit, og at bevægelserne ikke forsøges begrænset. Hvis borgeren er i fare for at slå/skære sig på en hård eller skarp genstand, fx en radiator, skal borgeren flyttes.

Et epileptisk anfald kan se voldsomt ud, så informer gerne andre folk omkring borgeren, om at borgeren har et anfald. Ofte stopper anfaldet efter nogle minutter, men det kan føles som lang tid.

Borgeren kan være meget træt eller forvirret efter et anfald, og derfor skal hvile tilbydes.

Buccolam kan gøre borgeren døsig og påvirke vejtrækningen, så derfor skal borgeren observeres tæt efter at have fået Buccolam

Kilder

Buccolam - step by step guide:

<http://www.cybermanual.com/how-to-administer-buccolam-midazolam-romucosal-solution.html?page=2>

Indlægsseddel: <http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/24522>

Bilag 1

Indsæt bilag