



# INSTRUKS FOR STESOLID

<b>Udarbejdet af</b>	Navn, titel: Sygeplejerske Mette Line Pedersen og Kvalitets- og Udviklingskonsulent Risikomanager Christine Vammen Dato: : 25/9-2019
<b>Revideret af</b>	Navn, titel: Sygeplejerske Annette Frederiksen Dato: 2021-11-22
<b>Godkendt af</b>	Navn, titel: Kvalitets- og Udviklingskonsulent Risikomanager Christine Vammen Dato: 2021-11-22
<b>Version</b>	Nr.: 1.1
<b>Formål</b>	At instruere personalet til at administrere Stesolid korrekt, så borgeren får brudt sit epileptiske anfald og opnår det bedst mulige resultat af behandlingen.
<b>Instruksens virkningsområde</b>	Pædagoger, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, ikke sundhedsfagligt personale og vikarer, der arbejder på Siriusparken.
<b>Ansvarsfordeling</b>	Medarbejderne har ansvar for at instruksen læses og efterleves. Lederen har ansvar for at instruksen er udarbejdet, tilgængelig og implementeret. Ledelsens ansvar er desuden, at der er ansat personalet, som er kvalificeret til og instrueret i at udføre den delegerede/opgaveoverdraget opgave.  Sygeplejersken på bostedets ansvar at personalet er oplært til at varetage opgaven efter instruks for opgave overdragelse. Medarbejderens ansvar at tilegne sig kompetencen til at udfører opgaven



# INDHOLD

<b>Metode .....</b>	<b>3</b>
Fremgangsmåde .....	3
<b>Dokumentation .....</b>	<b>4</b>
<b>Kvalitetskontrol .....</b>	<b>5</b>
<b>Baggrundsviden .....</b>	<b>5</b>
<b>Kilder .....</b>	<b>5</b>
Bilag 1 .....	6



## Metode

Denne instruks tager ikke udgangspunkt i én type anfald eller én bestemt dosis Stesolid, så læs derfor altid borgerens medicinskema og følg lægens ordination.

## Fremgangsmåde

### Når borgeren har et epileptisk anfald, skal følgende gøres:

- Hvis det er muligt, så notér tidspunktet hvor anfaldet starter og slutter.
- Find borgerens medicinskema og læs ordinationen på Stesolid.
- Tag underbukser og underbensklæder af borgeren.
- Sørg for frie luftveje hos borgeren ved at lægge borgeren på siden, gerne på venstre side, hvis det er muligt for herved at sikre, at medicinen har optimal virkning i endetarmen.
- Læg en pude eller trøje under borgerens hoved for at undgå stød og/eller slag.
- Tag engangshandsker på.
- Bryd forseglingen på beholderen med Stesolid og før forsigtigt klyasma med Stesolid ind i endetarmen på borgeren. Når tuben er på plads, tømmes den ved at klemme med tommel og pegefinger.



Foto:Medicin.dk




Foto: Medicin.dk

- Når Stesoliden er givet, holdes tuben sammenpresset, mens den tages forsigtigt ud, så medicinen ikke ryger tilbage i beholderen. Den lille mængde medicin der kan være tilbage, har ingen betydning for korrekt dosering.



Foto: Medicin.dk

- Klem borgerens balder sammen i ca. 3 minutter, hvis det er muligt, for at hindre at medicinen løber ud igen.
- Lad borgeren blive liggende på siden for at skabe frie luftveje.
- Bliv hos borgeren indtil borgeren er ved bevidsthed igen. Herefter observeres borgeren hvert kvarter den første time, og herefter hver halve time indtil borgeren er som vanlig.

#### Ring straks 112 hvis:

- anfaldet varer i mere end 5 minutter, og den ordinerede dosis Stesolid er givet til borgeren.
- anfaldet gentager sig
- anfaldet er anderledes eller længere end tidligere set.
- borgeren er kommet til skade under anfaldet.
- borgerens vejrtrækning bliver langsom eller stopper.
- anfaldet er fulgt af høj temperatur.
- borgeren efter brudt anfald virker konfus eller anderledes i adfærden end normalt.

## Dokumentation

<b>Autoriseret personale</b>	Alle autoriserede sundhedspersoner, fx sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, skal dokumentere udførelsen af deres arbejde, jf. journal-føringsbekendtgørelsen.  <b>Ikke autoriseret personale</b>  Dokumentationsforpligtelsen følger altid med udførelsen af en sundhedslovsopgave.
<b>Retningslinjer for dokumentation</b>	Dokumentér at borgeren har haft et epileptisk anfald. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notér tidspunktet for anfaldet</li> <li>• Hvor lang tid anfaldet varede</li> <li>• Notér hvor meget Stesolid, der er givet og hvordan effekten har været.</li> </ul>



	<p>Husk at dokumentere hvad dine kollegaer skal være særligt opmærksomme på, fx hvis der observeres ændringer i adfærd og vejtrækning.</p> <p>Dokumenter også i borgerens anfalds skema, da dette bidrager til at sikre, at borgeren får sikker behandling og opfølgning.</p> <p>Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten og senest inden vagtens ophør.</p>
<b>For social og Psykiatri</b>	gælder, at der dokumenteres i Cura
<b>For Omsorg og Sundhed</b>	gælder, at der dokumenteres i Cura efter gældende arbejdsgange.
<b>Ansvar</b>	<p>Det sygeplejefaglige personale er ansvarlige for at journalføre deres selvstændige opgavevaretagelse. Desuden skal det sygeplejefaglige personale journalføre delegeret og opgaveoverdraget pleje og behandling, der udføres som medhjælp.</p> <p>Det er lederens ansvar, at der er vikarlogin tilgængeligt.</p>

## Kvalitetskontrol

Beskriv kvalitetskontrol

## Baggrundsviden

Ved epileptiske anfald, er det vigtigt, at borgerens krop får lov til at bevæge sig frit, og at bevægelserne ikke forsøges begrænset. Hvis borgeren er i fare for at slå/skære sig på en hård eller skarp genstand, fx en radiator, skal borgeren flyttes.

Et epileptisk anfald kan se voldsomt ud, så informer gerne andre folk omkring borgeren, om at borgeren har et anfald. Ofte stopper anfaldet efter et par minutter, men det kan føles som lang tid.

Borgeren kan være meget træt eller forvirret efter et anfald, og derfor skal hvile tilbydes.

Stesolid kan gøre borgeren døsigt og påvirke vejtrækningen, så derfor skal borgeren observeres tæt efter at have fået Stesolid

## Kilder

Indlægsseddel for Stesolid

<http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/14203>



Epilepsiforeningen: <https://www.epilepsiforeningen.dk/epilepsi/>

## Bilag 1

Indsæt bilag