


Risikolægemidler



Vær særlig opmærksom på de syv grupper af lægemidler, som er nævnt med farve

Insulin

Blodfortyndende medicin

Digoxin

Gentamicin

Kalium

Methotrexat

Opioider



#stoptænk tjek

Insulin. Vær opmærksom på, at doseringen af insulin afhænger af værdien af borgerens blodsukker. Undgå forveksling af insulinpenne.

Blodfortyndende medicin. Vær opmærksom ved operation – er noget ændret i behandlingen? Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.

Digoxin. Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

Gentamicin. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet. Vær opmærksom ved nedsat nyrefunktion.

Kalium. Vær opmærksom på, at oral opløsning ikke må gives i.v. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

Methotrexat. Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis. Overdosering kan være dødelig.

Opioider. Vær opmærksom på symptomer på overdosering; virker borgeren sløv, træt eller forvirret? Husk at fjerne det gamle opioidplaster, før du sætter et nyt på huden.